

H. Prof. Dr. G. Reichmüller
hochachtungsvoll
D. Verf. 1886

Ueber die


Lane Medical Library

Organisation des Thrombus.



Von

Eduard Heucking.



Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1886.



Ueber die
Organisation des Thrombus.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Eduard Heucking.

Ordentliche Opponenten:

Dr. H. Westphalen. — Doцент Dr. W. Koch — Prof. Dr. R. Thoma.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1886.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Referent: Prof. Dr. R. Thoma.

Dorpat, den 17. November 1886.

Nr. 402.

Decan: Rachlmann.

Meinem Vater.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Allen meinen Lehrern der hiesigen Hochschule, insbesondere Herrn Prof. Dr. E. v. Wahl, dessen Assistent zu sein ich die Ehre hatte, sage ich meinen aufrichtigsten Dank für die genossene Belehrung und Unterweisung.

Herrn Prof. Dr. R. Thoma, auf dessen Anregung vorliegende Arbeit unternommen wurde, bitte ich meinen tiefgefühlten Dank entgegen zu nehmen für die mir während der Ausführung derselben in freundlichster Weise zu Theil gewordene Unterstützung.

Ich unternahm die histologische Untersuchung einer Anzahl sehr ausgebreiteter marantischer Thromben in der Absicht, zu der Ausfüllung einiger Lücken beizutragen, welche unsere Kenntnisse über die organisatorischen Vorgänge innerhalb der Thromben aufweisen. So sehr nämlich auch die Frage nach der Organisation der Thromben seit etwa einem Jahrhundert das Interesse sowohl der Pathologen als auch der Chirurgen in Anspruch genommen hat, und so nahe auch schon zu wiederholten Malen die ganze Frage ihrer Lösung zu sein schien — eine endgültige und vollständig befriedigende Klarlegung des spröden Gegenstandes in allen seinen Einzelheiten, ist bisher noch nicht erreicht worden.

Bei der Durchmusterung der großen auf »Thrombusorganisation« bezüglichen Literatur fällt namentlich der Umstand auf, daß die Untersuchung dieses Gegenstandes bisher in ziemlich einseitiger Weise vorgenommen worden ist. In demselben Masse, wie der Thrombus, der sich nach Unterbindung in einem Gefäß bildet, seit jeher ein bevorzugtes Object der mikroskopischen Untersuchung gewesen ist, — in ebendemselben Masse sind jene Thromben, welche in anderer Weise, als in Folge von Ligatur entstehen, nur höchst flüchtig behandelt worden. — Abgesehen von einigen

vereinzelt und dazu vollständig allgemein gehaltenen Hinweisen habe ich nirgends eine auch nur halbwegs vollständige und detaillirte Darstellung der organisatorischen Prozesse innerhalb ausgedehnter geschichteter menschlichen Thromben finden können. Die von Czerny¹⁾ im J. 1875 publicirte Mittheilung des Organisationsvorganges in einem geschichteten Thrombus, welcher innerhalb eines Aneurysma varicosum entstanden war, behandelt nur einzelne Seiten des Gegenstandes. In sehr fragmentarischer Weise findet sich die Organisation geschichteter Thromben von Thierfelder²⁾ in den Erläuterungen zu der Tafel XL seines Atlas der pathologischen Histologie besprochen. — Auch einige in allerjüngster Zeit erschienene oder neu aufgelegte Lehr- und Handbücher geben, neben den aus den älteren Auflagen herübergenommenen, meist der bekannten O. Weber'schen Abhandlung entlehnten Abbildungen, auch einige Zeichnungen nach Durchschnitten, welche, wie es scheint, aus geschichteten Thromben angefertigt sind; so in der Monographie von Heineke³⁾ über »Blutung, Blutstillung etc.« in der Deutschen Chirurgie, und in der neuesten Auflage des Orth'schen Lehrbuches⁴⁾. Im Text finden jedoch die geschichteten Thromben auch hier nur ganz beiläufig eine Besprechung, so daß wir auch aus ihnen nicht viel über die feineren histologischen Vorgänge erfahren. — Im Allgemeinen könnte somit der von

1) V. Czerny: Virchow's Archiv Bd. 62 p. 464. 1875.

2) A. Thierfelder: Atlas der pathologischen Histologie. Lieferung 6 u. 7, Taf. XL. Leipzig 1880.

3) W. Heineke: Blutung, Blutstillung etc. Lieferung 18 der von Billroth u. Lücke herausgegebenen Deutschen Chirurgie, p. 50 u. 51, Figg. 4, 5 u. 6. — 1885.

4) J. Orth: Lehrbuch d. spec. pathol. Anatomie. Lieferung I. p. 265. Fig. 63. — 1883.

Rindfleisch früher schon wiederholt und auch noch 1875 in der IV. Auflage seines Lehrbuches der pathologischen Gewebelehre p. 161 ausgesprochene Satz, daß die Organisation gerinneter Thromben ein noch völlig unbekannter Proceß sei, — mit vielleicht nur höchst geringer Einschränkung noch heute als gültig anerkannt werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus schien mir die mikroskopische Bearbeitung der mir zur Verfügung gestellten Thrombosen lohnend zu sein. Im Laufe der Arbeit bestätigten sich denn auch meine an dieselben geknüpften Erwartungen, und ich glaube durch die Veröffentlichung meiner Untersuchungsergebnisse einen Beitrag liefern zu können zur Abrundung unseres bisherigen lückenhaften Wissens über einige Einzelvorgänge, welche für die gesammte Lehre der Thrombenorganisation von nicht unerheblicher Bedeutung sind.

Die Geschichte der Thrombenorganisation beginnt mit den Beobachtungen und Untersuchungen J. Hunter's über die sogen. Plasticität des Faserstoffs. — Zwar wurde die Thatfache, dafs sich nach Verletzung eines Blutgefäfses in diesem selbst und in der nächsten Umgebung desselben ein Blutcoagulum bilde, bereits von J. L. Petit einige Jahrzehnte früher, im Jahre 1731, constatirt ¹⁾; Petit beschäftigte jedoch die Thrombusbildung nur so weit, als sie seiner Ansicht nach in rein mechanischer Weise, neben verschiedenen chirurgischen Encheiresen, dazu beitragen müsse, der Blutung aus der verletzten Stelle des Blutgefäfses Einhalt zu thun. Die Vorgänge, welche sich im Blutcoagulum selbst in der Folge abspielen, wurden von ihm vollkommen ignort. — Vollständig in demselben Sinne, nur den mechanischen Effect, die praktischen Vor- oder Nachtheile, welche die Thrombusbildung für den endgültigen Stillstand der Blutung mit sich bringt, berücksichtigend, bewegte sich die ganze, grofse literarische Fehde, welche durch die Petit'schen Mittheilungen in Frankreich und in England eingeleitet wurde. Ich begnüge mich damit, von der grofsen Zahl der Autoren, welche sich an diesem Streite theiligten, nur die wichtigsten Namen

1) Jean Louis Petit: Histoire de l'academie royale des sciences, 1731–1736.

zu nennen, nämlich: Morand¹⁾, Pouteau²⁾, Kirkland³⁾, Gooch⁴⁾, Ch. White (u. J. Aitken)⁵⁾, B. Bell⁶⁾. --

Erst der genialen Beobachtungsgabe und dem Forscherblicke eines John Hunter⁷⁾ war es vorbehalten gewahrt zu werden, daß sich innerhalb der geronnenen Blutmasse eine Gewebsentwicklung vollziehe. Da nun Hunter durch seine Untersuchungen dazu geführt wurde, dem Blute nicht nur in seinem flüssigen, sondern auch in seinem starren, geronnenen Zustande «Lebensstoff» innewohnen zu lassen, so folgerte er, daß die innerhalb des Coagulum auftretende aus Bindegewebe und Blutgefäßen bestehende Neubildung auf dem Wege einer morphologischen und chemischen Metamorphose aus dem Fibrin entsünde.

Hiermit war die Lehre von der Organisationsfähigkeit der plastischen und Blutextravasate begründet — und bis gegen die Mitte unseres Jahrhunderts blieb sie die beinahe unbestritten alleinherrschende. Eine große Menge gelegentlicher Beobachtungen und eine Reihe mit aller für damalige Zeiten nur möglichen Sorgfalt ausgeführten Untersuchungen, an welche sich die Namen der tüch-

1) Morand: *Mém. de l'Acad. Roy. des sciences*. Vol. V. Paris. 1736.

2) Claude Pouteau: *Mélanges de Chirurgie*. 1760. Lyon.

3) Kirkland: *Essay of the method of suppressing hemorrhages from divided arteries*. London 1763.

4) Gooch: *Chirurgical Works*, Vol. I. p 172. 1766.

5) Ch. White: *Cases in surgery with remarks, to which is added a treatise on the ligature of arteries by J. Aitken*. London 1770.

6) B. Bell: *A system of surgery*. Edinburgh 1783—1787.

7) J. Hunter: *Abhandlungen über das Blut, die Entzündung und die Schusswunden*. Deutsche Ausgabe von Hebenstreit Leipzig 1797. Bd. I, pp. 78, 196 u. 197.

tigsten Chirurgen und Pathologen, wie Ribes¹⁾, Bouillaud²⁾, Gendrin³⁾, Blandin⁴⁾, Lobstein⁵⁾, Andral⁶⁾, Meckel⁷⁾, Ph. v. Walther⁸⁾ u. A. knüpfen, trugen zum Ausbau dieser Lehre bei. Auch Cruveilhier⁹⁾ zweifelt nicht an der Organisationsbefähigung des Thrombus, — obgleich er andererseits einer «adhaesiven Entzündung» der Gefäßwand eine gewisse Bedeutung für den definitiven Verschluss des Gefäßes einräumt.

Unter den experimentellen Arbeiten jener Zeit verdienen namentlich zwei hervorgehoben zu werden; die von Stilling¹⁰⁾, im Jahre 1834 erschienene, welche auf Grundlage einer Experimentenreihe von 70 an verschiedenen Versuchsthieren (Hunden, Schafen und Pferden) ausgeführten Unterbindungen und Gefäßdurchschlingungen die Umwandlungsfähigkeit des Fibrin zu Bindegewebe und Blutgefäßen mit Hülfe der Loupenbeobachtung nachgewiesen zu haben schien. — Sodann die Arbeit von Zwicky¹¹⁾ aus dem Jahre

1) Ribes: *Revue médicale française et étrangère* T. III. 1825.

2) Bouillaud: *Archives générales de médecine* S. VI. T. V. 1824.

3) Gendrin: *Histoire anatomique des inflammations*. Tome II. Paris 1826.

4) Blandin: *Journ. hebdomadaire de médecine* Paris. Mai 1830.

5) Lobstein: *Patholog. Anatomie*, übers. v. Neurohr. Stuttgart 1834.

6) Andral: *Précis d'anatomie pathologique*. Bruxelles. 1830 und 1837.

7) Meckel: *Hdbuch der patholog. Anatomie*. Bd. II Leipzig 1818.

8) Ph. v. Walther: *System der Chirurgie*. Berlin 1833 u. 1843.

9) Cruveilhier: *Anatomie pathologique. Maladies des veines et des artères* 1832—1842

10) Stilling: *Die Bildung u. Metamorphose des Blutpropfes oder Thrombus in verletzten Blutgefäßen*. Eisenach 1834.

11) H. Zwicky: *Die Metamorphose des Thrombus*. Zürich 1845.

1845, der unter Henle's Aufpicien die ersten eingehenden mikroskopischen Beobachtungen über die Organisation der Blutgerinnfel im Allgemeinen und über die der Thromben im Besonderen veröffentlichte¹⁾. Zwick y trug jedoch in seiner Bearbeitung des Gegenstandes der inzwischen durch Schwann angebahnten Reformation der Begriffe über Histogenese Rechnung; glaubte auch am Schlusse seiner Arbeit auf dem von ihm durchforschten Gebiete zu einer Befähigung der bekannten, von seinem Lehrer Henle urgirten Modification der Schwann'schen Lehre in Bezug auf die Genese des Bindegewebes gelangt zu sein. Zwick y bestätigte im Allgemeinen die Thatfächlichkeit der Angaben Stilling's bezüglich der Bindegewebs- und Blutgefäßbildung im Thrombus, und wich nur in einzelnen, durchaus nicht principiell bedeuung besitzenden Punkten (beispielsweise über den Zeitpunkt der Entwicklung wirklicher Gefäße im Gerinnfel) von den Angaben seines Vorgängers ab. — Die Bedeuung der Zwick y'schen Arbeit beruht nur darin, daß sie bei fast allen Zeitgenossen jeden Zweifel an der Thatfächlichkeit der Organisationsfähigkeit des Fibrins beseitigte. — Die wenigen Stimmen, welche schon früher und auch jetzt noch gegen die Transformation des Faserstoffs zu vascularisirtem Bindegewebe sich erhoben, verhallten fast ganz unberücksichtigt.

Allmählich bereitete sich jedoch ein Umschwung der Anschauungen über die fundamentalen Grundlagen der Histogenese vor; wie zu erwarten war, verfehlte er auch nicht auf die Frage der Organisationsbefähigung der Blut-

1) Eine ganz kurze Beschreibung des mikroskopischen Befundes an einem organisirten Thrombus hatte schon Vogel im Jahre 1843 p. 102 seiner «Pathologischen Histologie nebst Erläuterungstafeln, Leipzig» — geliefert.

gerinnfel und der Thromben feine Streiflichter zu werfen. Der geniale Begründer der gegenwärtigen Aera der pathologischen Anatomie, R. Virchow, war es selbst, der sein allgemein gültiges Princip: *Omnis cellula e cellula* auch auf die organisatorischen Proceffe im Thrombus ausdehnte. Zu Beginn seiner Untersuchungen über die Vorgänge im geronnenen Blutpropfe noch vollständig auf dem Boden der Schwann'schen Theorie von der freien Zellbildung aus dem Cytoplastem stehend, acceptirte Virchow mit der Mehrzahl seiner Vorgänger und Zeitgenossen die Lehre von der Plasticität des Faserstoffes ¹⁾. Je mehr sich jedoch in ihm die Ueberzeugung herausbildete, daß in der Reihe alles Lebendigen ein ewiges Gesetz der continuirlichen Entwicklung bestche, daß, »wo eine Zelle entsteht, eine Zelle vorausgegangen sein muß« ²⁾ — desto mehr sah er sich dazu gedrängt, auch auf dem Gebiete der Organisation der Thromben die Annahme der freien Zellbildung aus der Substanz des Fibrins aufzugeben und für das bei der Bindegewebsmetamorphose der Thromben auftretende Gewebe eine Abstammung desselben von zelligen Elementen anzunehmen. Er fühlt sich daher im Jahre 1856³⁾ veranlaßt, die Frage aufzuwerfen, ob nicht in einem Theile der farblosen, durch den Gerinnungsact des Fibrins im Trombus eingeschlossenen Blutkörper, die Anfänge künftigen Bindegewebes zu sehen wären?

Von dieser Bindegewebsentwicklung im Thrombus selbst trennt Virchow jedoch die Bildung der innerhalb des Ge-

1) R. Virchow. Gesammelte Abhandlungen p. 73 (Physikalische Eigenschaften des Faserstoffes 1846).

2) R. Virchow: Die Cellularpathol. 4. Aufl. 1871. p. 24. Berlin.

3) R. Virchow: Gesammelte Abhandlungen p. 327.

rinnfels auftretenden Gefäße, die Vascularisation desselben; ohne sich bestimmt dafür auszusprechen, neigt er dazu, sie in der von Joseph Meyer¹⁾ beschriebenen Weise durch Sprossung aus den Vasa vasorum hervorgehen zu lassen. Der bedeutende Schritt, den Virchow in der Lehre von der Organisation des Thrombus weiter gethan, beruht darauf, daß er den Ausgangspunkt aller geweblichen, innerhalb des Gerinnfels auftretenden Proceßes entweder in vorgebildete Gewebe (für die Gefäße des sich organisirenden Thrombus), oder doch in präexistirende, und seiner Meinung nach lebens- und fortbildungsfähige Zellen (für das Bindegewebe des sich organisirenden Thrombus) verlegt; er entzog hiermit der bereits zu jener Zeit sehr eingeengten Domäne der Lehre von der sogen. freien Zellenbildung aus Blastem auch das Gebiet der Faferstofforganisation, welche wie er p. 327 sagt, »fast als die letzte Stütze der Ansicht von der Epigenese der Zellen betrachtet werden müsse. An dem Begriffe einer selbstthätigen Thrombenorganisation hat er jedoch insofern garnicht gerüttelt, als ja seiner Auffassung nach wohl der Hauptantheil der Gewebsmasse, welche man damals den permanenten Thrombus zu nennen pflegte, sämmtliches Bindegewebe nämlich, aus präexistirenden Bestandtheilen des frischen »transitorischen Thrombus« — aus den im Gerinnfel von vorn herein eingeschlossen gewesenen farblosen Blutkörperchen, hervorgeht.

Der von Virchow gegebene Hinweis auf die Bedeutung der farblosen im Gerinnfel eingebetteten Blutzellen für den Ausbau jener Bindegewebssubstanz, der es zur Aufgabe gestellt ist, den Blutpfropf mit der Zeit zu verdrängen, schien

1) Joseph Meyer. Annalen des Charitékrankenhauses. Jahrgang IV. p. 41. 1853. Berlin.

für die ganze Lehre von der Organisation der Thromben in hohem Maße fruchtbar werden zu wollen.

Eine mächtige Stütze erwuchs der Virchow'schen Ansicht durch die ebenso vielseitig als gründlich ausgeführten Untersuchungen O. Weber's¹⁾, dessen im Jahre 1865 veröffentlichte Darstellung der Bindegewebs- u. Gefäßentwicklung im Thrombus, trotz der vom Standpunkt unseres heutigen Wissens nothwendig geforderten Aenderungen in der Interpretation der von ihm eben so scharf beobachteten wie klar beschriebenen Thatfachen, auch heute noch großer Werth beizulegen ist. Obgleich Weber seine Anschauungen über den in Rede stehenden Proceß an experimentell hergestellten oder an aus Amputationsstümpfen stammenden Unterbindungsthromben demonstirt, hebt er doch hervor, daß derselbe in seinem Wesen sich überall gleich bleibe, wo auch immer es zu intravasculärer Gerinnung und nachträglicher Organisation des Gerinnsels gekommen sei. Für unsere Zwecke ist von besonderem Werthe die auf p. 146 enthaltene Bemerkung, daß er »auch bei wandständigen Thromben, besonders solchen, die sich in den Taschen der Venenklappen bilden, ganz dieselben Vorgänge der Organisation hat verfolgen können.

Schon nach 8 Tagen sah Weber im Thrombus nach der Injection der unterbundenen Gefäße mit gefärbten Leimmassen, neben den Anfängen der Bindegewebsbildung, auch deutliche Kanäle, in welche die Injectionsmasse vom Lumen des Gefäßes her eindringen konnte. Die Kanäle wurden von Reihen von Spindelzellen deutlich begrenzt. Wenn in dieser frühen Periode noch irgend ein Zweifel existiren könnte, daß es sich hier um ein echtes neuangelegtes Capillargefäßnetz im Thrombus handle, so schwinden diese Zweifel nach

1) O. Weber: im Handbuch der allg. und spec. Chirurgie von Pitha und Billroth. Bd. I, Abth. I. p. 139.

Weber vollständig, wenn man einen etwa 20-tägigen Thrombus untersucht (p. 145) — Das Gefäßsystem erhält fein Blut »offenbar von oben herab« —, aus dem Lumen des unterbundenen Gefäßes — indem der Blutstrom in den Thrombus direct übergeht.« Erst später bilden sich »Abflußkanäle durch Anastomosen, welche sich zwischen dem Gefäßnetz des Thrombus und den Vasa vasorum herstellen, wodurch dann durch den Thrombus eine »wirkliche Circulation« hergerichtet wird. — die Figg. 21 und 22 (p. 143), 24 (p. 145) und 25 (p. 146) stellen diese Verhältnisse bildlich dar. — Was nun die Herkunft des den Thrombus durchziehenden und von vornherein mit dem Lumen des unterbundenen Gefäßes in Verbindung stehenden Capillargefäßsystemes anbelangt, so läßt Weber dasselbe seinen Ursprung nehmen an Ort und Stelle, im Thrombus selbst. Er verwerthet die von Virchow ausgesprochene Vermuthung von der Umwandlungsfähigkeit der im Thrombus von vornherein eingeschlossenen farblosen Blutkörper zu dauernden Gewebsbestandtheilen dahin, daß er sie nicht nur für das Bildungsmaterial ansieht, aus dem sich das Bindegewebe entwickelt, welches in späteren Stadien der Thrombenorganisation in größerer Menge in den Gerinnfelmassen anzutreffen ist, sondern er läßt aus den farblosen Blutkörpern auch die Wandelemente der autochthon im Thrombus gebildeten Gefäße hervorgehen.

Der Faferstoff selbst und die rothen Blutkörperchen sind bei diesen Neubildungsprocessen gar nicht betheiligt; beiden kommt das Loos zu, zu Detritus zu zerfallen und allmählig reforbirt zu werden.

Zwei Jahre vor dem Erscheinen der Weber'schen Arbeit gelangte Billroth ¹⁾ auf Grundlage eigener Versuche in

1) Th. Billroth: Die allg. chirurg. Pathologie und Therapie. 1. Aufl. 1863. p. 114.

Bezug auf die Rolle der im Thrombus eingeschlossenen farblosen Blutkörperchen zu Resultaten, die den Weber'schen sehr nahe kommen; doch hält er noch außerdem insofern an den vor-Virchow'schen Ansichten fest, als er auch den rothen Blutkörperchen und dem Fibrin das Vermögen sich in Bindegewebs-Intercellularsubstanz umzuwandeln, zuschreibt.

In die 2^{te}, 1866 erschienene Auflage seines Lehrbuches nimmt Billroth (p. 120) die inzwischen bereits bekannt gewordene Darstellung Weber's bezüglich der Vascularisationsproceß des Thrombus auf.

Auch Rindfleisch¹⁾ schloß sich hinsichtlich aller Details der organisatorischen Vorgänge in der Hauptsache den Weber'schen Anschauungen an. Doch läßt er, ähnlich wie Billroth, daneben das Stroma der rothen Blutkörperchen in Bindegewebsgrundsubstanz übergehen.

Man hätte glauben können, daß jetzt, wo so gewiegte Autoritäten, wie die letztgenannten vier Forscher für die Befähigung der Blutgerinnung sich aus sich selbst heraus auf metaplastischem Wege zu vascularisirtem Bindegewebe umzuwandeln, eintraten — daß jetzt die Frage nach der Organisation der Thromben in ein vor gar zu heftigen Angriffen gesichertes Fahrwasser geleitet worden wäre. Doch fand gerade das Gegentheil hiervon statt. Zwar fehlte es fernerhin nicht vollständig an Beobachtern, welche sich für eine regelrechte Organisation der Blutgerinnung im Virchow-Weber'schen Sinne aussprachen; so Kocher²⁾, der

1) Rindfleisch: Lehrbuch der patholog. Gewebelehre. I. Aufl. 1867/1869. p. 153.

2) Th. Kocher: Ueber die feineren Vorgänge bei der Blutstillung durch Aeupressur, Ligatur und Torsion. Archiv für klin. Chirurgie. Bd. XI. p. 660. 1869.

in einer sehr beachtenswerthen, im J. 1869 erschienenen Arbeit über die Vorgänge der Gefäßverwachsung nach Unterbindung, Acupressur und Acutorion, sowohl für die Constanz eines Blutgerinnsels als auch für dessen selbstständige Organisation im Sinne Virchow's und Weber's, mit aller Entschiedenheit eintrat; ferner pflichtete auch Szuman¹⁾ noch im Jahre 1874 in mancherlei Beziehung den Weber'schen Darstellungen des Organisationsprocesses bei; und die Untersuchungen von Czernay²⁾ über den Verschluss der Gefässe nach Acupressur sind schliesslich hier noch insofern anzureihen, als auch von ihm neben einer Wucherung der Wandelemente des Gefässes, eine Vermehrung und Weiterentwicklung der im Thrombus eingeschlossenen farblosen Blutkörper beobachtet worden ist. — Im Grossen und Ganzen wurden jedoch die Anschauungen der Verfechter einer selbstständigen Organisation der Thromben zurückgedrängt durch die Beobachtung neu entdeckter histologischer Thatfachen, welche die Forschung nach der Histogenese des die Thrombusorganisation bewerkstelligenden Gewebes in ganz andere Bahnen leiteten.

Es erging von jetzt an den wenigen Vertretern der selbstständigen Metamorphose der Thromben zu einem lebensfähigen Gewebe genau so, wie früher ihren vereinzeltern Gegnern, jenen wenigen Stimmen, die sich einst gegen die allgemein acceptirte Lehre von der selbstständigen Organisation der Thromben erhoben hatten, aber bisher nicht zu allgemeiner Geltung kommen konnten.

1) Szuman: Untersuchungen über den temporären und dauernden Gefässverschluss nach Unterbindung und Acupressur. — Gekrönte Preisschrift der Breslauer med. Facultät 1874. Virchow-Hirsch's Jahresbericht f. 1875. I. Bd. p. 28

2) Czernay: Centralblatt f. d. medicin. Wissensch. 1868. Nr. 1.

Die Opposition gegen die Lehre von der Organisationsfähigkeit der Blutgerinnfel war allerdings nicht neu, sondern fast ebenso alt, wie diese Lehre selbst. Schon Jones¹⁾, dem wir die erste umfassende experimentelle Arbeit über den Vorgang der Blutstillung nach Gefäßverletzungen verdanken, thut der Organisationsvorgänge in seinem «inneren Blutcoagulum» gar nicht Erwähnung, sondern führt die Entstehung des das eröffnete Gefäßlumen verschließenden Gewebes auf andere, außerhalb des Gerinnfels sich abspielende Proceffe zurück. Einzelne Chirurgen, wie Rust²⁾ und Chelius³⁾, sträubten sich auch einige Zeit hindurch gegen die Annahme der Hunter'schen Anschauungen, bis auch sie schliesslich sich dem Einflusse der von der allgemeinen Zeitströmung acceptirten Lehre nicht entziehen konnten. Einzelne hervorragende Forscher verharren jedoch, ganz unbeirrt von den sich scheinbar häufenden Beweisen von der Thatfächlichkeit einer selbstständigen Organisation der Thromben, bei ihren für die damaligen Zeiten abweichenden Ansichten. So hob Remak⁴⁾ schon im Jahre 1840 hervor, dafs er nie eine Spur von Organisation im Thrombus wahrgenommen, und dafs seine Bestandtheile, Blutkörperchen und Faserstoff, nach vorhergehender Auflösung derselben, von der Blutmasse wieder resorbirt würden, und sprach auch noch 11 Jahre später (1851)⁵⁾,

1) J. F. D. Jones: A treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries etc. London 1805.

2) Rust: Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie. Berlin und Wien 1834 — 1835. Bd. 15. p. 206 und 219.

3) Chelius: Handbuch der Chirurgie 5. und 6. Aufl. Heidelberg und Leipzig 1840 und 1843.

4) Remak: v. Amon's Monatschrift für Medicin etc. Bd. III. p. 260, Note 1. 1840.

5) Deutsche Klinik 1851. Nr. 36, p. 391. Discussion über den Vortrag von Reinhardt über die «Metamorphose faserstoffiger Exsudate» in der Ges. für wissensch. Medicin in Berlin vom 4. Aug. 1851.

beharrlich dieselben Ansichten aus. — Mit aller Entschiedenheit trat auch R o k i t a n s k y ¹⁾ 1844 gegen die zu seiner Zeit herrschende Lehre auf: «die sogenannte Vascularisation der Thromben haben wir nie beobachtet» schreibt er; er hält das, was Andere dafür ansprechen, bloß für ein System von wandungslosen Kanälen; ferner neigt er dazu, eine Auflösung und Resorption der Bestandtheile des Thrombus im Sinne R e m a k's anzunehmen. In vollständig folgerechter Denkweise befreit Rokitansky auch die Nothwendigkeit einer Thrombusbildung für die endgültige Schließung eines unterbundenen Gefäßes.

Ferner spricht sich N o t t a ²⁾ 1851 gegen die Organisation des Thrombus aus und auch R e i n h a r d t ³⁾ betonte in demselben Jahre, daß die Elemente des Blutgerinnsels, ganz gleichgültig ob letzteres intravascular oder an anderem Orte entstanden ist, nie eine Spur von Organisation aufweisen; ihre Veränderungen seien durchaus regressiver Natur; das Gerinnsel schwinde von der Peripherie aus durch Resorption und mit dieser Resorption halte gleichen Schritt eine Gewebsneubildung, welche, wie unter allen physiologischen und pathologischen Verhältnissen, sich das Material zu ihrem Aufbau aus «kleinsten Portionen» eines flüssigen, aus den Gefäßen exsudirenden Cytoblastem («Bildungsmateriales») beziehe.

Es erscheint auffallend, daß die Ansichten so sehr bedeutender Forscher, wie es jene sind, deren Namen wir als hauptsächlichste Repräsentanten der Gegner der Thrombusorganisation angeführt haben, nicht bereits früher zu allge-

1) Carl Rokitansky: Handbuch der pathologisch. Anatomie. Wien 1844.

2) Notta: Gazette des hôpit. 1851. Nr. 13 und 14.

3) Reinhardt: Deutsche Klinik 1851. Nr. 36, p. 389.

meinerer Geltung gelangt sind. Es läßt sich dieses vielleicht nur dadurch erklären, daß die 1856 von Virchow gegebene Direction, den Ausgangspunkt der geweblichen Vorgänge im Thrombus in den farblosen Blutzellen des Gerinnfels zu suchen, im Princip allen Anforderungen der neuen cellular-pathologischen Anschauungsweise entsprach. Rokitansky, Reinhardt und Remak mußten es sich gefallen lassen, daß ihre an sich reellen Beobachtungen von der Mehrzahl der Zeitgenossen unberücksichtigt gelassen wurden, weil die Interpretation, welche sie den von ihnen gesehenen Thatfachen angedeihen ließen, mit den Anschauungen der rasch fortschreitenden Wissenschaft in einen unlösbaren Conflict gerieth.

Die 60-er Jahre bereicherten indeß unser Wissen mit der Kenntniß einer Anzahl neuer Thatfachen auf dem Gebiet der normalen und pathologischen Anatomie, welche dazu geeignet schienen, die Lehre von der Organisation der Thromben aus der ihr durch Virchow angewiesenen Bahn zu lenken. Sie konnten es jetzt mit Erfolg thun, weil sie, gleichzeitig mit den sich mehrenden Stimmen, welche sich gegen die Organisationsbefähigung der Thromben aussprachen, auf diejenigen Factoren hinzuweisen vermochten, welche geeignet erscheinen konnten, die bis dahin den farblosen Blutkörperchen des Gerinnfels zugeschriebene Rolle zu übernehmen.

Sowies Waldeyer ¹⁾ im J. 1867, nachdem bereits Cohn ²⁾ einige Jahre vorher (1860) die ersten Angaben über eine Betheiligung der Gefäßepithelien an den innerhalb des Thrombus sich abspielenden organisatorischen Vorgängen gemacht hatte, — darauf hin, daß ihn seine Untersuchungen dazu

1) Waldeyer: Zur patholog. Anatomie der Wundkrankheiten. Virchow's Archiv Bd. 40. 1867. p. 391.

2) B. Cohn: Klinik der embol. Krankheiten. Berlin 1860. p. 91.

geführt hätten, einer Proliferationsfähigkeit der Elemente der Intima unter gewissen Bedingungen in viel weiterem Grade das Wort zu reden, als sie in der letzten Zeit allgemein zugelassen wurde. Bezüglich der organifatorischen Proceßse in Blutgerinnfeln sagt er p. 391: »die ganze fogen. Organisation der Thromben u. der Blutergüße geht von den Gefäßwänden und den Umgebungen der Extravasate aus, und »zwar spielen für die Gefäße die Epithelien dabei »eine Hauptrolle, indem sie in den Thrombus »hineinwuchern. Die Intima vascularifirt sich von der »Media aus, von der Intima sproffen die Capillarschlingen »weiter in den Thrombus hinein, begleitet von zarten Spindelzellenzügen, welche die Grundlage der späteren Bindegewebssubstanz bilden. Das ergoffene Blut organifirt sich »niemals, sondern wird stets mit Zurücklassung von mehr oder weniger Farbstoff reforbirt oder bleibt in der bekanntesten Form alter Infracte bestehen« (p. 392).

Zu Ergebniffen, welche diese von Waldeyer zuerst präcifirte Bethheiligung des Endothels an der fogenannten Organisation der Thromben bestätigten, gelangten in der Folge eine ganze Anzahl von Forschern, über deren Untersuchungsresultate ich weiter unten kurz zu referiren haben werde. An dieser Stelle fei nur noch der fast gleichzeitig mit der Waldeyer'schen Publication veröffentlichten Untersuchungsresultate Thiersch's über den einschlägigen Gegenstand Erwähnung gethan.¹⁾ — Auf Grundlage feiner Injectionsversuche an Gefäßen verwundeter Weichtheile gewann er Befunde, welche eine Proliferationsfähigkeit des Gefäß-

1) C. Thiersch: Die feineren anatomischen Veränderungen nach Verwundung der Weichtheile. Handbuch d. allgem. u. spec. Chirurgie von Pitha u. Billroth. Bd. I. Abtheilg. 2. p. 549. ff.

epithels und seine Antheilnahme an den regenerativen Processen für ihn außer allen Zweifel stellten. Ferner sah er auch an ligirten Arterien, und zwar an den Stellen, wo der Ligaturfaden die Intima der Arterie getrennt hatte, schon in den ersten Stunden eine reichliche Wucherung des Gefäßepithels. Dieser Endothelwucherung schreibt Thierich eine wesentliche Bedeutung für das Zustandekommen des definitiven Gefäßverschlusses zu. Thierich hebt ferner hervor, daß von den Endothelien und deren Wucherung »die Vascularisation des Thrombus mindestens zum Theil, »wenn nicht hauptsächlich« abhängig sei. Auf eine detailirte Beschreibung dieses letzteren Vorganges geht er nicht ein, sondern fügt nur, um die Wichtigkeit der Endothelproliferation für die Gefäßbildung im Thrombus hervorzuheben, noch hinzu, daß überall da, wo das Arterienepithel entartet oder verloren gegangen sei, die Vascularisation nur langsam von statten gehe, indem von den umgebenden Geweben »aus in den Thrombus sich allmählich gefäßhaltige Fortsatze »hineinschieben« (p. 556).

Die Möglichkeit, sich im Einklange mit den principiellen Forderungen der cellular-pathologischen Anschauungen in noch anderer Weise den Aufbau jenes wohlorganisirten Gewebes, welches sich nach einiger Zeit an Stelle des intravasculär gelegenen Blutpropfes findet, zu erklären, gewährte die Entdeckung der selbstständigen Locomotionsfähigkeit der Eiter- und Bindegewebszellen. v. Recklinghausen¹⁾ dem wir diese Entdeckung verdanken, war es auch

1) F. v. Recklinghausen: Ueber Eiter- u. Bindegewebskörperchen. — Virchow's Archiv Bd. 28. p. 157. 1863.

selbst, der die Eigenschaften seiner Wanderzellen zur Erklärung der organisatorischen Vorgänge im Thrombus zu verwerthen suchte (p. 190). Die von ihm an Venenthromben unternommenen Untersuchungen wurden von Bubnoff¹⁾ unter seiner Leitung fortgesetzt, und führten zu dem Resultate, daß die ganze Bindegewebswucherung innerhalb des Thrombus eine Leistung der von den Schichten der Gefäßwand und aus dem umgebenden Gewebe eingewanderten Leucocyten sei. — Die Schlüsse, welche v. Recklinghausen und Bubnoff in Bezug auf die gewebusbildenden Eigenschaften der Wanderzellen für die Frage der Thrombusorganisation zu ziehen sich berechtigt fühlten, gewannen durch die fast gleichzeitig mit der zweiten Mittheilung von Bubnoff erschienene bekannte Arbeit Cohnheim's²⁾, in welcher den farblosen Blutkörpern in ihrem aus der Blutbahn emigrierten Zustande für sammtliche entzündliche und regenerative Proceßse die weitgehendste Bedeutung eingeräumt wurde, ganz erheblich an Bedeutung.

In einer abweichenden Weise schildert Tschausoff³⁾ den von ihm an experimentell hergestellten Unterbindungsthromben beobachteten Organisationsvorgang; er resumirt ihn auf p. 219 seiner Mittheilung mit folgenden Worten: alle Gewebe der Gefäßwand, insofern in ihnen Bindegewebe vorhanden ist, nehmen an ihm Theil; nur das Epithel der Intima und die Muskelfasern der Media nicht. — Bezüglich

1) N. Bubnoff: Ueber die Organisation des Thrombus. Centralblatt f. d. medicin. Wissenschaften 1867. Nr. 48, und Virchow's Archiv Bd. 44, p. 462. 1868.

2) J. Cohnheim: Ueber Entzündung u. Eiterung. Virchow's Archiv Bd. 40, p. 1. 1867.

3) Tschausoff. Ueber den Thrombus bei der Ligatur. v. Langenbeck's Archiv f. klin. Chirurgie. Bd. 11. p. 184. 1869.

der Vascularifation der Neubildung heisst es auf p. 225, dass die Gefässe auf Kosten der Gefässwand sich entwickeln; etwas Näheres über die Art und Weise, wie das geschieht, wird nicht weiter angegeben.

Als gemeinsames Resultat dieser, im Uebrigen in ihren Ansichten so bedeutend auseinandergehenden Meinungen, stellte sich nun das Factum heraus, dass die eigentlichen Elemente des Thrombus selbst keiner Umwandlung oder Weiterentwicklung zu einem höher organisirten Gewebe fähig wären, dass eine Organisation der Thromben in dem ursprünglichen Sinne des Wortes gar nicht stattfände. — Alles, was seit J. Hunter bis herab auf O. Weber's Zeit dafür galt und angesprochen wurde, beruhte auf Täuschung, insofern als von aussen, von den das intravasculäre Blutgerinnfel einschliessenden und umgebenden Geweben her, in die Substanz des Thrombus eindringende Gewebstheile für autochthon im Gerinnfel entstandene oder von vorn herein zu seinen Bestandtheilen zählende Elemente angesehen wurden. Der Begriff einer Organisation der Thromben und Blutgerinnfel im Allgemeinen, musste, in dem Sinne wie er früher aufgefasst wurde, fallen gelassen werden; es fand eine allgemeine Rückkehr zu der, vormals nur von einzelnen Forschern vertretenen Meinung statt; zu der Meinung der p. 20 erwähnten, mit Jones beginnenden Opposition gegen die damals herrschende Lehre von der Metamorphose und Organisation der Blutgerinnfel.

Wenn somit die Meinung von einer Weiterentwicklungsfähigkeit der in den Bestand und Aufbau des Gerinnfels eingehenden zelligen Bestandtheile zu dauerndem Gewebe, eine Organisation des Thrombus aus sich selbst heraus, als

beseitigt und endgültig ad acta gelegt angesehen werden konnte — so war hiermit die Frage nach der Herkunft und der Natur des Gewebes, welches nach längerer oder kürzerer Zeit einen intravascular entstandenen Blutpfropf allmählich durchwächst und schließlich vollständig substituirt, doch gewissermaßen nur nach ihrer negativen Seite hin entschieden. Die Forschung mußte sich nun aber auch an die Beantwortung der positiven Seite dieser Frage machen und in's Klare zu stellen suchen, welchen Zellen oder Geweben der Umgebung des Blutpropfes die Aufgabe zufalle, jenes vascularisirte Bindegewebe zu bilden, das an die Stelle des Thrombus tritt.

Cohn und Waldeyer einerseits und v. Recklinghausen, Bubnoff und Cohnheim andererseits hatten, wie früher auseinandergesetzt worden ist, auf zwei verschiedene Möglichkeiten, die bei dieser histogenetischen Frage in Betracht kommen, hingewiesen. Es handelte sich jetzt für die Forschung, eine Entscheidung im Sinne der einen oder der anderen dieser beiden Möglichkeiten festzustellen; oder aber für den Fall, daß beide Factoren: »Endothelproliferation und Emigration und Weiterentwicklungsfähigkeit farbloser Blutzellen sich in die Aufgabe der Organisation der Thromben zu theilen hätten, — jedem dieser beiden Factoren den ihm zukommenden Antheil festzusetzen. Um hierüber in's Klare zu kommen, schien es unbedingt nöthig zu sein, den Vorgang der Organisation in seinen verschiedensten Stadien zu untersuchen; namentlich durfte man sich aus nahe liegenden Gründen von der Beobachtung der frühesten Stufen derselben, von der Beobachtung ihrer Anfänge, wichtige Aufschlüsse versprechen.

Ein derartiges Beobachtungsmaterial konnte aber nur durch das Experiment, durch künstliche Herstellung von

Thrombenmaterial beschaffen werden. — Im letztverflossenen Decennium erschien denn auch eine große Anzahl von Studien und Schriften, in denen auf experimenteller Grundlage von der Organisation der Thromben und von «fogenannter Organisation der Thromben» die Rede ist. Man sollte nun annehmen, daß die anatomisch-pathologische Forschung der Frage nach dem woher? und wie? der Organisation von intravasculären Blutpfropfen ein sehr lebhaftes Interesse hätte zuwenden wollen. — Sieht man jedoch näher zu, so findet man, daß in den meisten dieser Arbeiten der Hauptnachdruck auf etwas ganz Anderes gelegt worden ist als auf die Beobachtung der bei der Durchwachsung und Organisation von Blutgerinnfeln stattfindenden Vorgänge.

Viele von ihnen wurden allerdings mit der Absicht unternommen, die organisatorischen Prozesse im Thrombus einer erneuerten Durchsicht zu unterwerfen; sie führten jedoch alle zu einem ganz anderen Ausgange: nämlich zur Beobachtung jener Vorgänge, welche den definitiven Verschluss und die Obliteration ligirter Gefäße innerhalb des Unterbindungsbezirktes bewirken. In einigen Arbeiten wurde auch der Vernarbungsproceß durch Schnitt verletzter Arterien berücksichtigt. Die Beobachtung jener geweblichen Vorgänge dagegen, welche zu einer Durchwachsung und Verdrängung des innerhalb des Unterbindungsbereiches liegenden und für sich selbst nicht organisationsfähigen Blutpropfes führen, nehmen meist eine ganz untergeordnete Stelle ein; oft geschieht ihrer nicht einmal Erwähnung.

Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich den Grund dieser Erscheinung in der Aenderung suche, welcher jenes Material, das zum Studium der Organisation der

Thromben verwendet wurde, in seiner Beschaffenheit seit Anfang der 70-er Jahre sich zu unterziehen hatte.

Seit jeher war es nämlich üblich gewesen, zu diesem Zwecke Unterbindungsthromben zu benutzen, und zwar sowohl solche, die sich nach Unterbindung des Amputationsstumpfes eines Blutgefäßes bildeten, wie solche, deren Entstehung durch Ligatur eines Gefäßes in seiner Continuität hervorgerufen wurden. Konnte man doch vor noch nicht so langer Zeit mit großer Bestimmtheit darauf rechnen, an der Ligaturstelle auch wirklich einen Thrombus vorzufinden; und bot doch obendrein die leichte Ausführung der Continuitätsligaturen an Versuchsthiere den zu Untersuchungszwecken so erwünschten Vortheil, eine ganze Serie von Thromben verschiedenen Alters in bequemer Weise beschaffen, und dadurch die eigentlich histogenetische Seite der Thrombusorganisation in Angriff nehmen zu können. Zu jener Zeit galten, nach fast ganz allgemein acceptirter Anschauung, die Bildung eines Gerinnsels und die Nothwendigkeit seiner Bindegewebsmetamorphose als unerläßliche Bedingungen des Zustandekommens des definitiven Verschlusses einer unterbundenen Arterie oder Vene; ohne Vermittelung des «provisorischen Thrombus», des Blutpropfes, war die Bildung des den dauernden Verschluss des Gefäßes sichernden «permanenten Thrombus» nicht denkbar. — In den letzten zehn Jahren ist jedoch in dieser Beziehung ein bedeutender Umschwung der Erfahrungen und Ansichten erfolgt, und zwar zum nicht geringen Theil veranlaßt durch die Umgestaltung der operativen Technik, welche die Ära der Antisepsis mit sich brachte; die Bedeutung der aseptischen Operation und Nachbehandlung hat über den Operationsaal des Chirurgen hinaus auch in die Arbeitsräume des Pathologen sich ihren

Weg zu bahnen gewußt. Mehr und mehr hat die Ueberzeugung an Boden gewonnen, daß, bei Beachtung der von der Antisepsis geforderten Vorschriften, die Bildung eines Gerinnsels nach der Unterbindung ein vollständig inconstantes und von Zwischenfällen abhängiges Ereigniß sei, welches, wenn es auch in der That gelegentlich stattfinden und nachträglich zur Organisation des Propfes führen sollte, doch in Bezug auf die Verschließung und Verwachsung des unterbundenen Gefäßes ein durchaus unwesentlicher und gleichgültiger Vorgang wäre.

Es ist interessant zu verfolgen, wie die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen schon längst behaupteten, aber halb der Vergessenheit anheimgefallenen und jedenfalls keiner allgemeinen Berücksichtigung gewürdigten Thatfachen sich genähert haben; leugnete doch schon Pouteau¹⁾ zu einer Zeit, wo die Streitfrage über die Organisation der Thromben noch gar nicht bestand, bereits im Jahre 1760, die Constanz der Gerinnselbildung nach einer Gefäßverletzung und somit auch ihre Bedeutung für die Blutstillung, und bekannte sich doch Rokitansky²⁾ im Jahre 1844 bereits zu einem Standpunkte, welchen die Forschung erst heute zu einem allgemein anerkannten erhoben hat, wenn er sagte: »Wir glauben, daß die Schließung eines unterbundenen Gefäßes auch ohne den Blutpropf zu Stande komme, daß dieser an und für sich eine zufällige Bildung und durchaus nicht eine unumgänglich nothwendige Bedingung der Obliteration sei.«

1) Claude Pouteau l. c.

2) Carl Rokitansky l. c.

Rokitansky und Reinhardt¹⁾ wiesen auch schon, um zu beweisen, daß zum Zustandekommen des Verschlusses von Blutgefäßen die Gegenwart eines Blutgerinnsels durchaus nicht erforderlich sei, auf die Obliterationsvorgänge in den Nabelarterien und im Ductus Botalli hin, wo sich die zur Obliteration führenden Vorgänge bei nachweisbarer Abwesenheit aller Blutgerinnsel abspielen. — Von der eben citirten Meinungsäußerung Rokitansky's ist bloß ein kleiner Sprung zu dem Standpunkte Senftleben's²⁾, welcher der Ansicht ist, daß eine nach der Unterbindung auftretende Blutgerinnung den bindegewebigen Verschluss des Gefäßes eher stört als befördert. Ueber die vollständig indifferente Rolle, welche dem Thrombus bei dem Verwachsungsproceß unterbundener Gefäße zukommt, sind wir heute durch eine ganze Reihe von experimentellen Studien aufgeklärt: Durante³⁾, Riedel⁴⁾, Baumgarten⁵⁾, Raab⁶⁾, Schultz⁷⁾, Senftleben⁸⁾ und Andere sind hierüber einer Ansicht, und diejenigen von ihnen, welche den Obliterationsvorgang eines zwischen zwei Ligaturen abge-

1) Reinhardt l. c. pag. 390.

2) Senftleben: Ueber den Verschluss der Blutgefäße nach der Unterbindung. — Virchow's Archiv. Bd. 77. p. 424. 1879.

3) Durante: Untersuchungen über die Organisation der Thromben. — Wiener medicin. Jahrbücher 1872. p. 143.

4) B. Riedel: Entwicklung der Narbe im Blutgefäß nach der Unterbindung. — Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 6. p. 459. 1876.

5) P. Baumgarten: Die sogen. Organisation des Thrombus. Leipzig 1877.

6) Fr. Raab: Entwicklung der Narbe im Blutgefäß etc. v. Langenbeck's Arch. f. klin. Chir. Bd. 23. p. 156. 1879.

7) Nadieschda Schultz: Vernarbung von Arterien nach Unterbindungen und Verwundungen. Deutsche Zeitschr. für Chirurgie. Bd. 9. p. 84. 1878.

8) Senftleben l. c.

schnürten Gefäßstückes beobachteten, haben die Erfahrung gemacht, daß die aus dem Kreislauf ausgeschaltete Blutfäule sich Tage, Wochen, ja Monate lang in flüssigem Zustande erhalten kann, ohne dadurch den Character des Obliterationsprocesses in seinem Ablaufe wesentlich zu beeinträchtigen. Auf Grundlage eigener Versuche, einer Serie von Doppelligaturen an Jugular- und Femoralvenen von Hunden, welche Exemplare von der Dauer von 4 Tagen bis zu 64 Tagen in sich schloß, bin ich in den Stand gesetzt, das monatelange Flüssigbleiben einer derartig aus dem Kreislauf ausgeschalteten und einer absoluten Stagnation unterworfenen Blutfäule, aus eigener Erfahrung und Anschauung zu bestätigen.

Während nun früher eine Untersuchung über den Verwachsungsvorgang ligirter Gefäße untrennbar war von einer Beobachtung der im Thrombus vor sich gehenden Umwandlungsprocessse, weil beide fast stets sich an demselben Objecte nebeneinander und zu gleicher Zeit abspielten, — wird heutzutage, wo die Bedingungen für das Zustandekommen eines Thrombus im Bereiche der unterbundenen Gefäßstrecke sehr ungünstig geworden sind, bei derartigen Untersuchungen meist bloß Gelegenheit geboten sein, den Obliterationsvorgang des Blutgefäßes, nicht aber mehr diejenigen Vorgänge zu beobachten, welche man unter dem — seinem ursprünglichen Sinne nach obsoleten, immerhin jedoch noch allgemein angewandten — Namen «Organisation des Thrombus» zusammenfaßt. — Die Forschung ließ sich, anfänglich ohne dessen selbst gewahr zu werden, durch die Aenderung, welche die Beschaffenheit des Versuchsmateriales erlitt, von der Beobachtung der organisatorischen Processse im Thrombus ablenken; später richtete sie ihr Augenmerk fast ausschließlich auf die sie am meisten inte-

reiffirenden Vorgänge der Vernarbung und Obliteration der Blutgefäße nach Unterbindungen und Verletzungen. — Diese Aenderung in der Beschaffenheit des zumeist zur Erforschung des Proceßes der Bindegewebsmetamorphose des Thrombus angewandten Materiales, glaube ich für den Stillstand auf dem Gebiete der Untersuchung einiger, in der Frage nach der Organisation der Thromben noch durchaus der Klärung bedürftigen Punkte verantwortlich machen zu müssen.

Was nun aber den Proceß der Obliteration und der Vernarbung ligirter und verwundeter Gefäße anbelangt, so haben wir unsere bereits nach mancher Richtung hin abgerundeten Kenntnisse darüber gerade den sehr zahlreichen und mühevollen einschlägigen Arbeiten der letzten fünfzehn Jahre zu verdanken. — Die Studien von Durante¹⁾, Cornil und Ranvier²⁾, Auerbach³⁾, Riedel⁴⁾, Baumgarten⁵⁾ und Raab⁶⁾, denen sich in jüngster Zeit noch die Arbeit von Senn⁷⁾ anschließt, haben den histologischen Vorgang der Gefäßverschießung nach Unterbindung soweit klargelegt, daß man ihn mit Rücksicht auf den Entstehungsort des Hauptantheils des obturirenden Gewebes, als eine Endarteriitis oder Endophle-

1) Durante: l. c., vergleiche auch seine Abhandlung: Untersuchungen über Entzündung der Gefäßwände. — Wiener medic. Jahrbücher 1871 pag. 321.

2) Cornil et Ranvier Manuel d'histologie pathologique. Paris 1873 und 1881.

3) Auerbach: Ueber die Obliteration der Arterien nach Ligatur. — Dissertation 1877. Bonn.

4) Riedel: l. c.

5) Baumgarten: l. c.

6) Raab: l. c.

7) N. Senn: Experiment. researches on cicatrization in blood-vessels after ligature. — Transactions of the American Surgical Association 1885. — Centralbl. für Chirurgie 1885 Nr. 22. pag. 388.

bitis fibrosa bezeichnen kann. Eine Wucherung der Elemente der Intima ist jedenfalls das Charakteristische und das Wesentliche des Proceßes. — Nadjeschda Schultz ¹⁾ gelangt zwar in ihrer Arbeit: »Ueber die Vernarbung von Arterien nach Unterbindungen und Verwundungen« zu dem von den Untersuchungsergebnissen aller übrigen Experimentatoren abweichenden und jedenfalls überraschenden Resultat, daß die Abstammung des das Lumen von Arterien verschließenden Gewebes eine verschiedene ist, je nachdem eine doppelte oder einfache Unterbindung vorausgegangen ist: die Generatoren jenes Bindegewebes, welches den abgeschnürten und des Blutes möglichst entleerten Arterienack zur Obliteration bringt, sind Wanderzellen im v. Recklinghausen-Cohnheim'schen Sinne; nach einfacher Unterbindung sind es dagegen aus der offenen Arterienstrecke, aus dem kreisenden Blute des unterbundenen Gefäßes stammende farblose Blutkörperchen, welche als Quelle des organisirten, die Verwachsung des Gefäßes herbeiführenden Gewebes anzusehen sind. — Doch läßt auch die Schultz'sche Darstellung dieser Proceße, trotz der abweichenden Interpretation, welche ihnen von Seiten der Verfasserin zu Theil werden, kaum eine andere Deutung zu, als daß auch hier die Obliteration der Gefäße durch endarteriitische Wucherung vor sich gegangen wäre. — Aus eigener Anschauung, auf Grundlage mikroskopischer Untersuchung von Serienschnitten, in welche (p. 32). die bereits erwähnten Unterbindungspräparate an Venen zerlegt wurden, kann ich mich auch nur dieser Deutung der Obliterationsvorgänge, wenigstens was ihren Ablauf an Venen anbetrifft, anschließen. — Auf die active Rolle, die dem

1) Nadjeschda Schultz: l. c.

Endothel bei diesen Vorgängen einzuräumen ist, geht speciell die neuerdings erschienene Arbeit von Pick¹⁾ ein. Pick ist es gelungen, die Erscheinungen einer auf indirecter Kern- und Zelltheilung beruhenden Proliferation der Endothelien des unterbundenen Gefäßes im Bereiche des Ligaturbezirkes nachzuweisen.

Die Untersuchungen über den Heilungsproceß an durch Schnitt verletzten Arterien, mit welchen uns die Publikationen von Schultz²⁾, Pfitzer³⁾ und Zahn⁴⁾ bekannt gemacht haben, berechtigen uns zu der Annahme, daß auch bei dem Ablaufe dieser »Narbenbildung« der Intima — oder präciser gesagt, dem Endothel — die Hauptleistung zufalle. Schultz ist auch in diesem Falle in der Interpretation des mit dem Mikroskop Gesehenen einer von der Ansicht der beiden andern genannten Autoren abweichenden Meinung. Sie schreibt die organisatorischen Proceße innerhalb der festen, homogenen, fibrinähnlichen Masse, welche die Arterienwunde nach der Verletzung schließt, den farblosen Blutkörperchen des in der verletzten Arterie kreisenden Blutes zu, also denselben Elementen, denen ihrer Ansicht nach auch die Bildung jenes Bindegewebes beizulegen ist, welches nach einfacher Unterbindung die Obturation des Gefäßlumens herbeiführt. — Doch kann bei der Vergleichung der von Schultz gegebenen Schilderung und Zeichnungen

1) Pick: Ueber die Rolle der Endothelien bei der Endarteriitis post ligaturam. — Zeitschrift für Heilkunde Bd. 6. — Fortschritte der Medicin Nr. 15 1886.

2) N. d. Schultz: l. c.

3) R. Pfitzer: Ueber den Vernarbungsvorgang an durch Schnitt verletzten Blutgefäßen. Virch. Arch. Bd. 77. p. 397. 1877.

4) W. Zahn: Untersuchungen über die Vernarbung von Querrissen der Arterienintima und Media nach Umschnürung. Virch. Arch. Bd. 96. p. 1. 1884.

mit denen der beiden anderen Forscher, kaum ein Zweifel darüber existiren, daß den von ihr wahrgenommenen Vorgängen nur jene Deutung beizulegen wäre, welche Pfitzer und Zahn ihren eigenen Befunden zu Theil werden lassen.

Die Forschung auf dem Gebiete der Verwachsung ligirter Gefäße hat aber noch einen weiteren, bedeutsamen Schritt vorwärts gemacht; sie hat uns nicht nur über das Wesen des histologischen Vorganges aufgeklärt, sondern uns auch Einblicke geschafft in den inneren, causalen Zusammenhang, welcher zwischen dem Act der Umschnürung eines Gefäßes und der im Unterbindungsbereich sich vollziehenden Umgestaltung des Gefäßlumens besteht; sie hat uns gezeigt, daß der Obliterationsvorgang eines unterbundenen Gefäßes nicht sowohl Ausdruck und Folge einer durch die Ligatur gesetzten »entzündlichen Reizung« der Gewebe des Gefäßrohres und seiner nächsten Umgebung wäre, sondern, daß er ganz unabhängig hiervon, eine Consequenz der durch die Unterbindung gesetzten Veränderung der circulatorischen Bedingungen innerhalb des Ligaturbezirkes wäre.

In dieser Hinsicht sind die Angaben von Schultz¹⁾, daß nämlich zwischen der GröÙe und Form des »permanenten Thrombus« (will sagen: der in der Intima neugebildeten Bindegewebsmassen) und der Entfernung und Lage der nächsten, oberhalb und unterhalb der Ligatur abgehenden Seitenzweige der unterbundenen Arterie, eine enge Beziehung bestehe, von großem Werthe. Thoma²⁾ hat

1) N. Schultz: l. c. p. 100.

2) R. Thoma: Ueber die Abhängigkeit der Bindegewebsneubildung in der Arterienintima von den mechanischen Bedingungen des Blutumlaufes. II. Mittheilung: Das Verhalten der Arterien in Amputationsstümpfen. — Virchow's Archiv Bd. 95 p. 294. 1884.

darauf den Nachweis zu liefern gesucht, daß Form und Ausdehnung dieser Intimawucherung, somit auch die Umgestaltung der Gefäßlichtung, in eine directe Beziehung zu der durch den Act des Verschlusses der Arterie gesetzten Umänderung der Circulationsbedingungen gebracht werden müsse. Die Verlangsamung des Blutstromes, welche in Folge der Ligatur eintrete, bewirke eine compensatorische Bindegewebswucherung in der Intima, welche eine Ausgleichung des durch den Verschluss des Gefäßes gesetzten Mifsverhältnisses zwischen den abgeänderten Strömungsverhältnissen und der Weite des Gefäßlumens herbeiführe, und dem entsprechend sich oft sehr weit von der Ligaturstelle weg erstreckte.

Diese Erklärung des Zusammenhanges der Erscheinungen gewinnt noch wesentlich an Nachdruck durch den von Thoma schon in einer früheren Publikation ¹⁾ erbrachten Nachweis, daß ganz analoge Beziehungen zwischen gewebsbildenden Processen in der Arterienintima einerseits und den mechanischen Bedingungen der Blutströmung andererseits auch unter vollständig normalen, physiologischen Verhältnissen statt haben. Thoma wies dieses Verhältniss nach an der Bindegewebswucherung, welche ganz constant nach der Geburt in der Intima des zwischen Ductus arteriosus Botalli und den Nabelarterien eingeschalteten Abschnittes der kindlichen Aorta auftritt; auch sie müsse als eine compensatorische angesehen werden und hätte ihre Ursache in dem durch die Obliteration der beim

1) R. Thoma: Ueber die Abhängigkeit der Bindegewebsneubildung in der Arterienintima von den mechanischen Bedingungen des Blutumlaufes. I. Mittheilung: Die Rückwirkung des Verschlusses der Nabelarterien und des arteriösen Ganges auf die Structur der Aortenwand. — Virchow's Archiv Bd. 93. 1883,

Fötus sehr weiten Nabelarterien bedingten hämodynamischen Effecte.

Wenn somit die Forschungen der letzten 15 Jahre unsere Kenntniffe über die Vorgänge, welche die Obliteration unterbundener Gefäße und die Vernarbung verletzter Arterien herbeiführen, in einer im Allgemeinen befriedigenden Weise abgerundet haben, so können wir von ihnen nicht dasselbe behaupten in Bezug auf die Klarlegung der Details jener Proceffe, welche bei der Durchwachsung und allmäligen Verdrängung intravasculärer Blutgerinnfel, zur Beobachtung gelangen. Es war eben in letzter Zeit zu wenig Gelegenheit geboten worden, ausgedehnte Blutpröpfe zu beobachten, weil meist an aseptisch ausgeführten Unterbindungsferien gearbeitet worden ist. Die aseptische Ligatur an sich hat aber keine Thrombusbildung in ihrem Gefolge, und es hatte das Interesse der Forscher, wie bereits auseinander gesetzt wurde, sich von den inconstanten Thromben und deren Organisation ab-, und lediglich dem Verwachsungsvorgange unterbundener oder irgend wie in ihrer Continuität verletzter Blutgefäße zugewandt. Es ist daher auch nicht ganz leicht, aus den zerstreuten und wenig übersichtlich gehaltenen Angaben der einschlägigen Literatur der letzten Zeitperiode ein klares und einheitliches Bild zu skizziren über die Weiterentwicklung des uns speciell interessirenden Gegenstandes, nämlich der : Organisation der Thromben« d. h. also der Summe jener regenerativen Proceffe, welche, sofern sich ein intravasculäres Gerinnfel gebildet hat, zu einer allmäligen Durchwachsung und Verdrängung desselben führen.

Die Schwierigkeiten, die einem solchen Vorhaben sich entgegenstellen, werden noch durch einen ganz eigenartigen

Umstand erhöht. Sehr häufig geschieht es nämlich in den zahlreichen hierbei in Betracht kommenden Mittheilungen, daß durch eine unpräcise Anwendung der Ausdrücke: »Organisation der Thromben«, »provisorischer« und »permanenter Thrombus« ein richtiges Verständniß der geschilderten Vorgänge ungemein erschwert wird. So sprechen beispielsweise mehrere Autoren — selbst noch in der allerletzten Zeit — von einer »Organisation des Thrombus« und fogar von einem »organisirten Thrombus« in solchen Fällen, wo gar keine intravasculäre Gerinnselformung, also auch gar keine Thrombusbildung dem organischen Verschlusse des unterbundenen Gefäßes vorausgegangen ist. wo es sich lediglich handelt um die Obturation des Gefäßes auf dem Wege jener Endarteriitis resp. Endophlebitis fibrosa, welche in ihrer Entstehung und in ihrem Ablaufe ganz unabhängig dasteht von der Anwesenheit oder von dem Fehlen eines Coagulums. Mitunter ist es fogar, dank der ungeeigneten Anwendung dieser Ausdrücke, kaum möglich, sich eine klare Vorstellung davon zu machen, welche Zustände und Vorgänge die Autoren unter dieser oder jener Bezeichnung verstanden, wissen wollen.

Auf p. 24 und 25 wurde schon angeführt, daß die von v. Recklinghausen begründete, von Cohnheim weiter ausgeführte und zu fast allgemeiner Bedeutung für sämtliche entzündlichen und regenerativen Prozesse erhobene Lehre von den gewebsbildenden Eigenschaften der Wanderzellen auch auf die Thrombenorganisation, und zwar zuerst von v. Recklinghausen selbst in Anwendung gebracht wurde. Dieser Auffassung wurde auch in den verbreitetsten pathologischen und chirurgischen Lehr- und Handbüchern unter allen Hypothesen über das sehr wenig aufgeklärte

Wegen der Thrombenorganisation ihrer Zeit die erste Stelle eingeräumt; so in der 1869 erschienenen Auflage des Billroth'schen Lehrbuches; so in der III. Auflage p. 166 vom Jahre 1873, und in der IV. Auflage p. 161 vom Jahre 1875 des Lehrbuches von Rindfleisch. — Als nun noch einige experimentelle Studien veröffentlicht wurden, welche den Beweis zu liefern schienen, daß aus den emigrierten farblosen Blutzellen in der That Fibroblasten und wirkliches perma- nentes Bindegewebe sich zu entwickeln im Stande wäre, — hierher gehören die beiden Arbeiten von Ziegler¹⁾, ferner diejenigen von Senftleben²⁾ und Tillmans³⁾ — und als inzwischen noch Götte⁴⁾ von seinem Standpunkte als Em- bryologe die Ansicht verfocht, daß die dem Blute entstam- menden Zellen für das indifferente Bildungsmaterial auch des ausgebildeten Thieres zu halten sind, welches alle Aus- fälle ergänzt und alle Neubildungen ausführt, und eben- daher nach Ursprung und Bedeutung als eine Fortsetzung «des embryonalen Bindegewebes erscheint», — da schien die Frage nach der Richtung hin gelöst, daß in der That den farblosen Blutkörpern die Haupt-, wenn nicht gar einzige Rolle an all' den gewebl- lichen Vorgängen, welche sich innerhalb des in einem Gefäße liegenden Thrombus abspie- len, zuzuertheilen wäre.

1) E. Ziegler: Experiment. Untersuchungen über die Herkunft der Tuberkel Elemente 1875; und: Untersuchungen über patholog. Binde- gewebs- und Gefäßneubildung. 1876.

2) Senftleben: Ueber den Verschluss der Blutgefäße nach der Unterbindung. Virchow's Archiv Bd. 77 pag. 421. 1879.

3) H. Tillmans: Experimentelle und anatom. Untersuchungen über Wunden der Leber und Niere. Ein Beitrag zur Lehre von der Wundheilung. Virchow's Archiv Bd. 78 pag. 437. 1879.

4) Götte: Entwicklungsgeschichte der Unke. Leipzig 1874.

Doch lassen sich die mit Fug und Recht wiederholt von verschiedenen Forschern erhobenen Einwände gegen die Stichhaltigkeit und Beweiskraft der von den genannten Experimentatoren angestellten Versuche sehr gut aufrecht erhalten; sehr beachtenswerth sind namentlich die Widerlegungen der Senftleben'schen Ansichten über die Bindegewebsbildung in todtten, doppelt unterbundenen und in die Bauchhöhle lebender Thiere versenkten Gefäßstücken, welche jüngst von Burdach ¹⁾ publicirt worden sind.

Ebenso fehlt es bisher an jeder zuverlässigen und unanfechtbaren, unmittelbaren Beobachtung des Umwandlungsprocesses einer Leucocyte zu einer richtigen Bindegewebszelle. Bekanntlich glaubte Ziegler den Nachweis dieses Processes experimentell geliefert zu haben. Durch gelegentliche Veranlassung dazu angeregt, habe ich die Ziegler'schen Glasplättchenversuche in einer größeren Experimentenreihe einer Wiederholung unterzogen. Ich gelangte allerdings zu einer Bestätigung seiner objectiven Befunde; nie fand ich dagegen Anzeichen von Umwandlungsvorgängen lymphoider Zellen in epithelioide Zellen, in Zellen, welchen Ziegler mit Rücksichtnahme auf ihre vermeintliche functionelle Bedeutung den Namen »Fibroblasten« beigelegt hat. Ich muß mich in dieser Hinsicht vollständig jenen Autoren anschließen, welche sich ablehnend verhalten gegenüber der Annahme einer gewebsbildnerischen Befähigung der Leucocyten. — Nach all dem Vorhergehenden muß somit der Versuch, die Organisation der Thromben auf dem Wege der Transformation emigrirter farbloser Blutkörper zu Bindegewebe zu erklären, als ein solcher betrachtet werden, dem

1 Fr. Burdach: Ueber den Senftleben'schen Versuch etc. — Virchow's Archiv Bd. 100, pag. 217. 1885.

eine gesicherte und zuverlässige Basis vorläufig noch abgeht. — In den letzten Jahren hat denn auch diese Ansicht von dem Organisationsmodus der Thromben sehr viel von ihrer Popularität eingebüßt. Ziegler tritt in der neuesten Auflage seines Lehrbuches der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomie¹⁾ von allen Autoren, welche sich in jüngster Zeit über diesen Gegenstand ausgesprochen haben, noch am entschiedensten für diesen Modus ein. Doch räumt auch er nebenbei anderen Factoren, speciell einer Endothelwucherung des thrombosirten Gefäßes, beim Vorgange der Organisation eine nicht unwesentliche Rolle ein. — Desgleichen wird auch in der letzten unter Winiwarter's Mitarbeiterchaft herausgegebenen Auflage des Billroth'schen Handbuches²⁾ abweichend von den früheren Darstellungen zugegeben, daß es mancherlei Modificationen der Thrombusbildung — will sagen der Thrombusorganisation — gebe.

Dahingegen hat durch die Untersuchungen der letzten 15 Jahre die von Cohn und Waldeyer zuerst ausgesprochene und sehr bald darauf von Thiersch bestätigte Ansicht, daß die Durchwachsung und allmälige Verdrängung, kurz die „Organisation« der Thromben, eine Aufgabe und Leistung des Gefäßendothels wäre, immer mehr an Boden gewonnen. Zwar wird, wie von mir schon hervorgehoben worden ist, in den Mittheilungen aller jener Autoren, welche als Ausgangspunkt der die Obliteration unterbundener Ge-

1) Vierte Auflage, p. 11.

2) Th. Billroth und A. v. Winiwarter: Die allgemeine chirurg. Pathologie und Therapie XII. Auflage, pag. 159. 1885.

fälsche bewirkenden Neubildung die Intima in Anspruch nehmen, dem Thrombus und den geweblichen Vorgängen, welche sich in ihm abspielen, im Ganzen wenig Aufmerksamkeit geschenkt; es wird meist nur das Zufällige seiner Entstehung constatirt und seine Bedeutungslosigkeit für den Proceß der Vernarbung und Obliteration des Gefäßes hervorgehoben; trotzdem finden sich in diesen Mittheilungen Hinweise und Andeutungen, welche dafür sprechen, daß auch die Durchwachsung intravasculärer Blutropfe und deren schließliche Substitution durch organisirtes Gewebe eine Leistung der Intima, beziehungsweise deren Endothel, wäre. — In Bezug auf das Detail dieses Vorganges und in Bezug auf mancherlei gleichzeitig und neben der Endothelproliferation ablaufende Vorgänge weichen die genannten Autoren in ihrer Darstellung wiederum nicht unwesentlich von einander ab. Doch sprechen sich Raab¹⁾ und Riedel²⁾, welche sich von den neueren Autoren noch am eingehendsten mit den Vorgängen der Thrombusorganisation beschäftigen, verhältnißmäßig am entschiedensten für eine reine Endothelproliferation als Grundlage aller im intravasculären Gerinnsel vor sich gehenden organisatorischen Proceß aus. Auf Einzelnes in den Riedel'schen Befunden werde ich noch später bei Besprechung meiner eigenen Untersuchungsergebnisse eingehen müssen. — In allerjüngster Zeit wird einer activen Bethheiligung des Endothels bei den Organisationsvorgängen auch in den einschlägigen Kapiteln des Lehrbuches von Orth³⁾ und der Monographie von Heinecke⁴⁾ das Wort geredet.

1) Fr. Raab: l. c. pag. 192 bis 197.

2) B. Riedel: l. c. pag. 461 bis 464.

3) J. Orth: l. c. pag. 265.

4) W. Heinecke: l. c. pag. 49 bis 53.

Doch sind alle diese Angaben sehr fragmentarisch und lückenhaft. Es fehlt bisher an einer klaren und einheitlichen Darstellung der Organisationsvorgänge im Thrombus in ihrer reinen Form, nämlich unabhängig und abgetrennt von den endarteriitischen oder endophlebitischen Processen, welche im Geleite der Unterbindung unausbleiblich auftreten und die Erscheinungen der reinen Thrombenorganisation compliciren und vielfach durchkreuzen müssen. Der Fusion dieser beiden, ihrem Wesen nach vollständig heterogenen Vorgänge ist es zuzuschreiben, daß das Interesse der Forscher sich in den letzten 15 bis 20 Jahren den wirklichen Organisationsvorgängen der Thromben dergestalt entfremdet hat, daß wir als letzte, auf das Wesen der Thrombenorganisation eingehende Untersuchungen eigentlich nur die citirten Arbeiten von O. Weber und Kocher aus den 60-er Jahren zu nennen haben. Alle späteren haben es wohl wahrscheinlich erscheinen lassen, daß die die intravasculären Blutpröpfe durchwachsende Bindegewebsneubildung von der Intima des thrombosirten Gefäßes, resp. von deren Endothel, ausgehe. Ueber die bei der Organisation stattfindenden Einzelvorgänge ist unser Wissen jedoch durch alle diese Arbeiten nur in einem sehr geringen Grade bereichert worden.

Daher schien es mir lohnend zu sein, an einem geeigneten Untersuchungsmaterial die Frage nach der Thrombusorganisation nochmals einer Bearbeitung zu unterziehen. Daß Unterbindungs-Thromben keineswegs zu einem brauchbaren Untersuchungsmaterial zu rechnen sind, geht aus Allem, was ich bisher über die der Literatur entnommenen Forschungsergebnisse zusammengestellt habe, klar hervor; auch meine eigenen, oben erwähnten Unterbindungsexperimente führten mich zu dieser Ueberzeugung. — Es galt daher sich ande-

res, geeigneteres Material zu verschaffen. Als solches muß ich die marantischen Thromben ansehen, — eine Thrombenart, welche, wie ich in den einleitenden Worten zu dieser Arbeit mitgeteilt habe, der histologischen Forschung bisher fast vollständig entgangen ist. — Die Vorzüge, welche gerade geschichteten marantischen Thromben hinsichtlich der uns beschäftigenden Frage nach der Thrombenorganisation zukommen, bestehen aber darin, daß wir in ihnen ein Beobachtungsmaterial besitzen, in welchem sich, wie vorauszusetzen ist, die innerhalb der intravasculären Blutgerinnung sich abspielenden organisatorischen Prozesse typisch rein darstellen müssen und nicht complicirt mit solchen Bindegewebswucherungen der Intima, welche durch die Unterbindung unvermeidlich hervorgerufen werden und leicht zu einem die Beobachtung der Organisationsvorgänge störenden Moment werden können.

Das Material, an dem ich meine Untersuchungen ausgeführt habe, bestand aus einer Anzahl ausgebreiteter Venenthrombosen, welche zu sehr verschiedenen Zeiten Leichen entnommen und im hiesigen pathologischen Institut aufbewahrt wurden. Es handelte sich in allen Fällen entweder um Thromben, welche gleichzeitig mehrere Venen der unteren Extremitäten oder eine Anzahl Halsvenen ausfüllten. Stets ergaben hierbei die zugehörigen Sectionsprotocolle, daß die Träger der Thrombosen lauter decrepide, an multiplen tuberculösen und cariösen Processen leidende Individuen gewesen waren. Mehr oder weniger hochgradige Arteriosclerose, mit oder ohne gleichzeitig bestehende Klappenfehler des Herzens, war auch vorhanden, so daß es keinem Zweifel unterworfen sein kann, daß die von mir untersuchten Thromben bezüglich ihrer Entstehungsursache als „marantische“ zu bezeichnen sind.

Die Härtung sämmtlicher Präparate geschah in Müller'scher Flüssigkeit und in Alcohol. Die gehärteten Objecte wurden in Celloidin eingebettet und mit dem Mikrotom in Stufenschnitte zerlegt.

Zunächst interessirten mich die Structurverhältnisse der Thrombusformationen. Solche Befunde, die als eine Bestätigung hätten dienen können zu der in jüngster Zeit zu-

erst von Lubnitzky¹⁾ beobachteten, von Eberth²⁾ und Schimmelbusch³⁾ genauer verfolgten Entstehung intravascularer Gerinnsel durch Conglutination von „Blutplättchen“, boten sich mir bei der Untersuchung meiner Präparate nirgends dar. Bei der Zerlegung meiner Objecte in Stufen und Serienschnitte fand ich oft im Bereiche ausgedehnter Venenstrecken ganz frische Gerinnfelbildungen; nirgends fanden sich jedoch Andeutungen von „Blutplättchenthromben.“ Dagegen konnte ich den frischeren Gerinnungen sehr häufig die Entstehung nach dem von Zahn⁴⁾ für sie in Anspruch genommenen Bildungsmodus ansehen. Sie bestanden oft aus ausgesprochen »weissen« Thromben; vielfach fanden sich jedoch auch grössere oder kleinere Abschnitte, die aus rothen Thromben bestanden, und noch viel häufiger handelte es sich um Combinationen dieser beiden Grundformen, um »gemischte Thromben«. — Die ersten Veränderungen, welche an den Thromben sich einstellen, bestehen in einer Umwandlung ihrer Substanz zu einer mehr oder weniger feinkörnigen Masse, welche sich durch Alauncarmin sehr intensiv und sehr gleichmässig dunkel färbt und, dem geschichteten Bau des Thrombus entsprechend, concentrische Streifung aufweist. Gleichzeitig

1) Sophie Lubnitzky: Die Zusammensetzung des Thrombus in Arterienwunden in den ersten 5 Tagen. — Archiv für experim. Pathologie und Pharmakologie Bd. 19 pag. 185. 1885.

2) u. 3) C. Schimmelbusch: Die Blutplättchen und die Blutgerinnung. — Fortschritte der Medicin 1885 Nr. 4 pag. 97.

J. C. Eberth und Schimmelbusch; Experimentelle Untersuchungen über Thrombosen — ebendaselbst — Nr. 13 pag. 380.

J. C. Eberth und Schimmelbusch: Experimentelle Untersuchungen über Thrombosen. Virchow's Archiv Bd. 103 pag. 39 u. Bd. 105 pag. 331. 1886.

4) W. Zahn: Untersuchungen über Thrombose. Virchow's Archiv Bd. 62 pag. 81. 1875.

geht aber eine Umwandlung zu hyaliner Substanz vor sich, in welcher, auch wiederum den Schichtungsverhältnissen der Thrombenmassen entsprechend, sich Spalten- und Kanalsysteme entwickeln: die Thrombussubstanz nimmt den Character des von Langhans¹⁾, N. Schultz²⁾, P. Meyer³⁾, v. Recklinghausen⁴⁾ und Anderen beschriebenen »kanalisirten Fibrins« an. In diese Spalten dringen nicht selten von Neuem die Elemente des Blutes ein, um dort zu gerinnen und zu zerfallen. Mit vorschreitendem Alter der Thromben gewinnt die hyaline Formation immer mehr an Ausdehnung und die organisatorischen Vorgänge spielen sich meist an solchergestalt umgewandelten Thrombusabschnitten ab.

Annähernd gleichzeitig mit diesen Vorgängen laufen Proceffe ab, welche Veränderungen der äusseren Formen und Gröfsenverhältnisse der Thromben herbeiführen. Die Thromben unterliegen in toto einer Schrumpfung, wodurch einzelne Abschnitte der Thrombusoberfläche sich von der Innenwand der sie einschliessenden Venen ablösen; aus den Theilen der Venen, in denen die Thrombose keine obturirende ist, drängt sich in solchen Fällen das Blut zwischen die Venenwand und die Thrombusoberfläche und bewirkt auf grössere Strecken reichende Abhebungen der letzteren von den vorher mit ihr in Contact gewesenen Venenwänden.

1) Langhans: Untersuchungen über die menschliche Placenta. Archiv für Anat. und Physiol. Anatomische Abtheilung. 1877.

2) Nadjeschda Schultz: l. c. pag. 109.

3) P. Meyer: Ueber Periarteriitis nodosa oder multiple Aneurysmen der mittleren und kleineren Arterien: Virchow's Archiv Bd. 74. 1878 und Archives de physiologie normale et pathologique. 1880.

4) v. Recklinghausen: Handbuch der allgem. Pathologie des Kreislaufes und der Ernährung. — Deutsche Chirurgie Lieferung 2 und 3. 1883.

Dadurch entstehen in vielen Fällen um den Thrombus cylindermantelförmige, blutführende Räume. Allein diese Räume zeigen vielfache Unterbrechungen, da die Ablösung der Thromben nur selten sich längs ihrer ganzen Circumferenz geltend macht, vielmehr die Thromben an manchen Stellen dauernd in Contact verbleiben mit der Venenwand. Auf Querschnitten stellen sich die beschriebenen Räume dar als blutführende, bald gröfsere, bald kleinere, zwischen einzelnen Abschnitten der Thrombusoberfläche und der Venenintima eingeschaltete Spalten und Lücken. Schon von Virchow¹⁾ wurde hervorgehoben, dafs durch diese Spalträume eine Art partieller Wiedereröffnung der durch die Thrombenmassen verlegten Blutbahn hergestellt werden könne.

Die ersten Vorgänge, welche zu einer Organisation der intravasculären Gerinnfel führen, stellen sich dar als eine **Wucherung des Endothels der thrombosirten Vene**. Die Endothelwucherung greift an den Rändern der mit dem Thrombus in Contact verbliebenen Stellen der Venenwand auf den Thrombus über. Hierauf breitet sie sich längs dessen Oberfläche aus, so weit dieselbe nicht in Contact geblieben ist mit der Venenwand, und schafft ihr dadurch eine Bekleidung, bestehend aus einer Lage endothelialer Zellen. Wo dagegen der Contact zwischen Thrombus und Venenwand ein dauernder ist, da geht das Endothel der Vene zu Grunde. Der Endothelwucherung auf der Thrombusoberfläche folgt eine Bindegewebsneubildung, welche, auch wieder von den Contactstellen her sich allmählich längs der Thrombusoberfläche vorschiebend, eine bedeutende Mächtigkeit gewinnen kann, und als eine breite, unter der Endothelmembran des Thrombus liegende, bindegewebige

1) R. Virchow: Gesammelte Abhandlungen. pag. 325.

Randwucherung den Thrombus umgiebt. — Sodann bilden sich aus dem Endothelüberzug Capillaren, indem von der freien Fläche der Endothelmembran sich Einkinkungen in die Thrombusmasse hinein begeben. Dieselben verzweigen sich im Thrombus und schaffen auf diese Weise ein weitverzweigtes Capillarnetz, dessen Wandungen ursprünglich nachweislich nur aus endothelialen Zellen bestehen und dessen Blut ihm direct aus den frei gebliebenen oder dem Blutstrom wiedereröffneten Theilen des Venenlumen zufließt. Die primären endothelialen Wandungen dieser Capillarröhren entwickeln eine Adventitia capillaris, welche späterhin durch weiteres Wachsthum in dickere Bindegewebszüge übergeht.

Eine zweite Gruppe von Capillarschlingen geht aus den Vasa vasorum hervor. — Die Vasa vasorum erfahren im Bereiche der Contactstellen zwischen Thrombus und Venenwand regelmässig eine stärkere Ausbildung, als ihnen normal zukommt. Die von ihnen ausgehenden neuangelegten Schlingen treten an den Contactstellen in den Thrombus ein, verzweigen sich sodann in der Thrombusmasse und entwickeln an ihrer Oberfläche in gleicher Weise eine Adventitia capillaris, welche späterhin in breitere Bindegewebsmassen sich umwandelt. Diese auf dem Wege der Adventitiabildung entstandenen Bindegewebsmassen können in vorgerückten Organisationsstadien so mächtig werden, daß sie als selbstständige Narbenmassen sich darstellen, so daß bezüglich der Beobachtung ihrer Entstehung und Ausbildung die Untersuchung solcher Objecte, welche die ersten Vorgänge der Organisation aufweisen, von der größten Wichtigkeit erscheint. — An keiner Stelle gelang es mir eine Bindegewebsneubildung nachzuweisen, welche unabhängig oder räumlich getrennt wäre von den gewucherten Endothelien;

und ganz speciell möchte ich dabei darauf hinweisen, daß bei der innerhalb der Thrombenmassen vor sich gehenden Bindegewebsneubildung für die eingewanderten Zellen und farblosen Blutkörper durchaus keine Betheiligung in der ihnen von v. Recklinghausen, Cohnheim, Bubnoff, Ziegler, Senftleben, Tillmans und Anderen zugedachten Weise nachzuweisen war. Vielfach sind dieselben allerdings in geringer Zahl vorhanden, aber zuweilen fehlen sie gänzlich in den Gebieten der lebhaftesten Gewebsneubildung, in der Nähe der sich vorschiebenden Sprossen der Capillarwände und an der Stelle des ersten Auftretens der Adventitia.

Die beschriebenen zwei Capillargefäßsysteme, welche ihrem Ausgangspunkte und ihrem primären Ausbreitungsbezirke nach scharf von einander zu trennen sind, treten in der Folge mit einander in Verbindung. Auf diese Weise stellt sich eine Verbindung her zwischen den Vasa vasorum einerseits und den freigebliebenen Theilen des Lumen der thrombosirten Vene andererseits.

Die weiteren Veränderungen beschränken sich darauf, daß die vorhandenen Bindegewebszüge an Mächtigkeit zunehmen, dagegen, wie es schon von einer großen Anzahl von Forschern festgestellt worden ist, die Zahl der neugebildeten Gefäße mit der Zeit einer Reduction unterliegt, so daß in den letzten Stadien der Organisation die Masse des Bindegewebes den Blutgefäßen gegenüber in hohem Grade überwiegt: das Gewebe, welches sich an der Stelle des einstmaligen Thrombus vorfindet, nähert sich im Laufe der Zeit immer mehr dem Charakter eines vollständig ausgebildeten Narbengewebes — In demselben Maße, wie das Bindegewebe an Mächtigkeit zunimmt, schwinden die Ueberreste der Thrombussubstanz. Einige kleine, hier und da in den Narbenmassen zerstreute Ansammlungen braunen, kör-

nigen Pigmentes sind die letzten Ueberbleibsel, welche für die einstmalige Existenz eines Thrombus sprechen.

Einzelne Momente in meiner Schilderung der organisatorischen Vorgänge im Thrombus erinnern an Angaben, welche sich bereits bei früheren Autoren, die diesen Gegenstand bearbeitet haben, vorfinden.

In einer Weise, die meiner Darstellung in manchem Punkte ähnlich ist, beschreibt Weber ¹⁾ die Vascularisationsverhältnisse im Thrombus. Seinen Untersuchungen zufolge beziehen die ersten, schon nach 8 Tagen nach der Unterbindung sich bildenden Gefäßanlagen des Thrombus, welche in den Anfangsstadien der Organisation keinerlei Verbindungen mit den Vasa vasorum aufzuweisen haben, ihr Blut direct aus dem Lumen des unterbundenen Gefäßes. -- Wenn man geringeres Gewicht darauf legt, daß Weber den Zusammenhang der den Thrombus durchziehenden Capillaren mit dem Lumen des thrombosirten Gefäßes auf der Endfläche seiner Ligaturthromben fand, während ich an marantischen Thromben denselben Zusammenhang an den Seitenflächen nachwies, welche der Thrombus dem Lumenrest der Vene zuwendet, so kann man sagen, daß meine Befunde in diesem Punkte diejenigen von Weber bestätigen. — In einer von der Weber'schen Ansicht abweichenden Weise muß ich dagegen die Bedeutung der Vasa vasorum für den Organisationsproceß der Thromben auffassen. Weber läßt allerdings in späteren Organisationsstadien sich Communicationen zwischen den Vasa vasorum und dem im Thrombus entstandenen Capillargefäßsystem herausbilden; immerhin legt er ihnen nur die Bedeutung von «Abzugskanälen» bei, welche lediglich circulatorischen Zwecken dienen sollen: sie sollten dazu

1) O. Weber l. c., vergleiche pag 16 ff. dieser Schrift

dienen, durch den Thrombus eine »wirkliche Circulation« herzustellen. Meine Untersuchungen dagegen zeigen mir, daß außer dieser von Weber betonten Aufgabe, der von den Vasa vasorum ausgehenden Gefäßneubildung für den gesammten Organisationsproceß noch Leistungen von ungleich wichtigerer Bedeutung zukommen. Erstens liefert sie einen bedeutenden Beitrag zur Vascularifation der intravasculären Gerinnungen. Es giebt Abschnitte in den von mir untersuchten ausgedehnten Thromben, wo die Vascularifation der Gerinnfelmassen fast ausschließlich auf diesen Modus zurückzuführen ist. Sodann stellen sich die von den Vasa vasorum in den Thrombus hineingewucherten Gefäßschlingen als eine der Hauptquellen für die Entstehung jenes narbigen Bindegewebes dar, welchem die Aufgabe der allmäligen Substitution der Gerinnfelmassen zufällt. — Da Weber in den früheren Stadien der Organisation den Zusammenhang der im Thrombus injicirten Kanäle mit präexistirenden Gefäßen nicht erkennen konnte; da er ferner nichts von den Proliferationsvorgängen an dem Endothel des thrombosirten Gefäßes wahrgenommen hat, welche in der Folge auch auf den Thrombus übergreifen und zur Entstehung des von mir beschriebenen Capillarnetzes führen: — war er genöthigt, eine autochthone Entstehung der Capillaren im Thrombus anzunehmen. Er that dieses, conform den damals herrschenden Ansichten über Histogenese, indem er mit Virchow den im Thrombus eingeschlossenen farblosen Blutkörperchen die Fähigkeit ausgiebiger Gewebsbildung zusprach. Meine Untersuchungen zeigen hiergegen, daß die Gefäßbildung im Thrombus, eben so wie die Bindegewebsneubildung, immer von präexistirendem Gefäßendothel ausgeht.

Eine Andeutung der von mir mit größter Regelmäßigkeit fast auf jedem Quer- und Längsschnitt wahrgenomme-

nen Endothelwucherung auf der Oberfläche der Thromben, desgleichen auch einer von ihr ausgehenden Gefäßbildung, findet sich in der Abhandlung von Riedel¹⁾. In der Fig. 5. b der Tafel VI bildet Riedel den Querschnitt durch einen Unterbindungsthrombus ab, der in seiner ganzen Peripherie umgrenzt ist von einer scharfen, kernführenden Linie. Riedel hält diese Linie für den Durchschnit einer Endothelmembran, welche, von der Gefäßwand aus, die frei in das Lumen des unterbundenen Gefäßes hineinragende Kuppe des Thrombus überwuchert hat. Von dieser Membran gehen stellenweise Ausläufer in das Innere des Thrombus hinein; zuweilen drang Injectionsmasse von der Aorta aus in Begleitung der genannten Ausläufer in den Thrombus mehr oder weniger weit ein.« Dafs es sich hier um die ersten Anfänge einer Gefäßbildung handelt, welche in der Weise vor sich geht, wie ich sie in meinen Präparaten so häufig gesehen habe, scheint mir ziemlich zweifellos zu sein; Riedel hebt jedoch dieses garnicht hervor und legt ihm nirgends besondere Bedeutung bei.

Zum Schlufs möchte ich noch darauf hinweisen, dafs die von mir beschriebenen organisatorischen Prozesse im Thrombus mannigfache Analogieen mit dem Auftreten der Capillaren im Embryo aufweisen. In die hyaline Thrombusmasse wachsen die Capillaren und die Bindegewebszüge in ähnlicher Art hinein, wie nach den Erfahrungen von His in den Körper des Embryo. Die Gefäßbildung innerhalb der Thromben, ein pathologisch-regenerativer Vorgang, hat also sein Vorbild auf physiologischem Gebiete.

1) B. Riedel: l. c. pag 462.



Thefen.

1. Mechanische Momente spielen bei der Entstehung der Thromben nur eine untergeordnete Rolle.
 2. Es giebt weder einen »provisorischen« noch einen »definitiven Thrombus«, sondern nur einen »Thrombus« schlechtweg.
 3. Die Lehre von der Umwandlungsfähigkeit emigrirter farbloser Blutzellen zu persistenten Bindegewebelementen ist ganz fallen zu lassen.
 4. Es ist darnach zu streben, die Epicystotomie zum Normalverfahren für die Entfernung der Blasensteine bei Kindern zu erheben.
 5. In der chirurgischen Kinderpraxis ist Sublimat jedem anderen Antisepticum vorzuziehen.
 6. Das diphtheritische Contagium ist ein äusserst fixes Contagium.
-

